Beiselen **TOP MagnesiumCarboxylat** – Wichtige Hinweise zur Anwendung

Nur trockene Blätter behandeln. Regenfestigkeit tritt nach ca. 2 Stunden ein.

Beiselen TOP Blattdünger* stets als letzte Komponente in den Tank geben.

Einfache Ausbringung und Handhabung durch sehr gute Mischbarkeit mit gängigen Pflanzenschutzmitteln und hervorragende Netz- und Haftwirkung. Spezielle Formulierung verhindert Verstopfungen der Siebe und Düsen.

* Bitte beachten Sie in jedem Fall vor dem Einsatz aller Präparate die Gebrauchsanweisung! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Irrtum vorbehalten. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Beiselen

Beiselen GmbH
Magirusstraße 7–9 · 89077 Ulm
fon +49 (0) 7 31 · 93 42-0
www.beiselen-top.de · info@beiselen-top.de

© Beiselen GmbH 01/2016

Beiselen **TOP**
Spezial-Dünger



Beiselen **TOP MagnesiumCarboxylat**



Beiselen

Beiselen **TOP MagnesiumCarboxylat** enthält wasserlösliches Magnesium gebunden an Carbonsäuren, welche in Pflanzen natürlich vorkommen. Dadurch kann es von der Pflanze stressfrei aufgenommen werden und ist direkt pflanzenverfügbar.

Dieser Blattdünger hilft Ihnen, Ihre Kulturen zum Bedarfszeitpunkt optimal mit Magnesium zu versorgen und dadurch die Photosyntheseleistung zu steigern.

Funktionen in der pflanzlichen Ernährung

- **Magnesium**
  - zentraler Baustein des Chlorophylls
  - aktiviert Enzyme, die den Aufbau von Kohlenhydraten und Eiweiß ermöglichen
  - trägt zur Stabilität der Zellwände bei
  - reguliert den Wasserhaushalt
- **Stickstoff**
  - essentiell für die Eiweißsynthese
  - Baustein von Chlorophyll und vielen Enzymen
  - verbessert die Nährstoffaufnahme

MgO+N

Beiselen **TOP** MagnesiumCarboxylat

Der **Magnesium**Versorger

Nährstofflösung:

119 g/l **wasserlösliches Magnesiumoxid** gebunden an Carbonsäuren
80 g/l **wasserlöslicher Stickstoff**

Anwendungsempfehlung

Kultur	Ziel	Empfehlung
Kernobst	Magnesiumversorgung	Mehrmals 4 l/ha ab Ende der Blüte (bei berostungs-anfälligen Sorten ab Walnuss-größe)
Steinobst	Magnesiumversorgung, gegen vorzeitigen Blattfall	2-3 mal 4 l/ha ab Blühbeginn
Beerenobst	Magnesiumversorgung	2-3 mal 4 l/ha ab Blühbeginn
Weinrebe	Magnesiumversorgung, Vorbeugung von Stiel-lähme, Verbesserung der Blattqualität	Mehrmals 4 l/ha ab Gescheine sichtbar