Beiselen

Pflanzenbau Aktuell Nr. 11/2018
Herbizideinsatz in Sojabohnen

Die **langsame Jugendentwicklung** der Sojabohnen führt dazu, dass der Fokus beim Anbau auf der Unkrautregulierung liegt. Fruchtfolgen mit hohem Maisanteil lassen ein höheres Unkrautvorkommen, vor allem an wärmebedürftige Spätkeimer, erwarten.
Der Einsatzschwerpunkt, der zur Verfügung stehenden Produkte, liegt ganz klar im **Vorauflauf.** Um die Wirkung der Herbizide zu gewährleisten, sind eine **ausreichende Bodenfeuchte** und ein **gut abgesetztes Saatbett** die Grundvoraussetzungen. Kommt es zu evtl. Minderwirkungen der Bodenherbizide durch Trockenheit, ist eine Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern im **Nachauflauf** mit **Harmony SX** oder **Clearfield-Clentiga + Mero** möglich.

Übersicht: Herbizidauswahl zum Einsatz in Sojabohnen

Herbizid	**Wirkstoff**	**Wirkstoffgehalt** (g/kg bzw. l)	**zugel. Anwendungs-zeitraum** (BBCH)	**zugel. Aufwandmenge** (l bzw. kg/ha)	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Ackerhellerkraut	Ackerhohlzahn	Amarant	Ausfallraps	Ehrenpreis	Franzosenkraut	Gänsefuß, Melde	Kamille	Klettenlabkraut	Schwarzer Nachtschatten	Stiefmütterchen	Taubnessel	Windenknöterich
Einzelprodukte																				
Artist	Flufenacet + Metribuzin	240 + 175	00-09	2,0	xxx	xx	xx	xxx	xxx	x	xx	xxx	xx	xx	xx	xx	x	x	xxx	x
Centium 36 CS	Clomazone	360	00-09	0,25	-	-	-	xx	(x)	(x)	-	xx	(x)	(x)	(x)	xxx	(x)	(x)	xxx	xx
Clearfield-Clentiga + Mero*)	Quinmerac + Imazamox	250 + 12,5	10-25	1,0 + 1,0	x	-	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx
Harmony SX + Trend	Thifensulfuron	480,6	bis 14	2x 0,0075	-	-	-	xxx	xx	xxx	xx(x)	-	x	x	xx	-	-	-	-	x
Sencor liquid	Metribuzin	600	bis 05	0,4	xx	xxx	xx	xxx	x	x	x	xx	xx	xxx	xxx	-	x	xx	xx	(x)
Spectrum	Dimethenamid-P	720	00-09	0,8-1,4	x	xxx	xx	x	x	xxx	-	x	xxx	x	xxx	(x)	x	-	xxx	(x)
Stomp Aqua	Pendimethalin	455	VA	2,6	(x)	xx	(x)	xx(x)	xx	xx(x)	-	xxx	x(x)	xx(x)	x	x(x)	xx	xxx	xxx	-
Mischungen																				
Centium 36 CS + Sencor Liquid + Spectrum	Clomazone + Metribuzin + Dimethenamid-P	360 + 700 + 720	VA	0,2 + 0,4 + 0,75	xx(x)	xxx	xx	xxx	x(x)	xx(x)	x	xx(x)	xx	xxx	xxx	xx(x)	x(x)	x(x)	xxx	xx
Centium 36 CS + Artist	Clomazone + Flufenacet + Metribuzin	360 + 175 + 240	VA	0,2 + 1,5	xxx	xx	xx	xxx	xx(x)	x(x)	xx	xxx	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	x	xxx	xx
Stomp Aqua Pack	Pendimethalin + Dimethenamid-P	455 + 720	VA	1,6 + 0,8	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	(x)

*) Zulassungserweiterung nach Art. 51

Copyright © Beiselen GmbH · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte!
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Auflagen von Clomazone-haltigen Produkten bei der Frühjahrsanwendung

NT127 - Die Anwendung des Mittels darf ausschließlich zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens erfolgen, wenn Tageshöchsttemperaturen von mehr als 20°C Lufttemperatur vorhergesagt sind. Wenn Tageshöchsttemperaturen von über 25°C vorhergesagt sind, darf das Mittel nicht angewendet werden.

NT149 - Der Anwender muss in einem Zeitraum von einem Monat nach der Anwendung wöchentlich in einem Umkreis von 100 m um die Anwendungsfläche prüfen, ob Aufhellungen an Pflanzen auftreten. Diese Fälle sind sofort dem amtlichen Pflanzenschutzdienst und der Zulassungsinhaberin zu melden.

Die weiterführenden Clomazone-Auflagen der Herbstanwendung entfallen!

Beachten Sie bei der Ausbringung von **Pendimethalin-haltigen Produkten** die weiterhin gültigen Auflagen NT145, NT146 und NT170.

Gräserbehandlung

Die **Gräserbehandlung** muss auch bei den Sojabohnen konsequent durchgeführt werden. Für eine ausreichende Bekämpfungsleistung sollten sich die **Gräser im 2- bis 4-Blatt-Stadium** befinden.

Übersicht: Graminizide zum Einsatz in Sojabohnen

Herbizid	**Wirkstoff**	**Wirkstoffgehalt** (g/kg bzw. l)	**zugel. Anwendungszeitraum** (BBCH)	**max. zugel. Aufwandmenge** (l bzw. kg/ha)	Ackerfuchsschwanz	Jährige Rispe	Hirse-Arten	Ackerbohne	Futtererbse	Lupine	Sojabohne
Graminizide											
Focus Aktiv-Pack	Cycloxydim	100	NA	1,25 + 1,25	xxx	-	xxx	✓	✓	-	✓
	Cycloxydim	100	NA	geg. Quecke: 2,5 + 2,5	xxx	(x)	xxx	✓	✓	-	✓
Fusilade MAX	Fluazifop-P	107	NA	1,0	xxx	-	xxx	✓	✓	✓	✓
	Fluazifop-P	107	NA	geg. Quecke: 2,0	xxx	(x)	xxx	-	✓	✓	✓

Hinweis: Seit letztem Jahr sind jegliche Pflanzenschutzmaßnahmen auf ökologischen Vorrangflächen, die im Rahmen der Greening-Auflagen mit Körnerleguminosen bestellt werden, verboten!

Copyright © Beiselen GmbH · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte!
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.