Pflanzenbau Aktuell Nr. 22/2018
Chemische Vorerntemaßnahmen bei Zwiewuchs und/oder Unkrautdurchwuchs

Aufgrund der vermehrten Anfragen zur chemischen Vorerntebehandlung bzw. Erntesicherung finden Sie untenstehend eine Übersicht der Indikationen:

Kultur	Zulassung/Indikation	Anwendungsbestimmungen/ besondere Auflagen	Anwendungs-zeitpunkt
Getreide Gerste, Weizen, Triticale, Roggen, Hafer	Lagernde **Teilflächen**, auf denen wegen Unkrautdurchwuchs oder bei Zwiewuchs in lagerndem oder stehendem Getreide eine Beerntung nicht möglich ist	ausgenommen sind Saat- und Braugetreide WA 700, WA 701, WA 702 VV 835, NG 352	ab Vollreife (Kornfeuchte unter 25%. Fingernagel-druck bleibt auf dem Korn erhalten)
Raps	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter zur Spätbehandlung	ausgenommen zur Saatgut-erzeugung NG 352	bei ca. 50 % ausge-reifter Schoten (reif, schwarz/ hart)
Ackerbohnen/ Futtererbsen	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter zur Spätbehandlung	ausgenommen zur Saatgut-erzeugung NG 352	bei ca. 50 % reifer Hülsen (Samen sind trocken, hart)

Hinweis: Die Auflagen WA 700, WA 701 und WA 702 sind Bußgeld- und CC- relevant

Auswahl zugelassener Produkte für die Spätanwendung:

Produkt	Aufwandmenge je Kultur			Warte-zeit (in Tagen)	Anwendungsbestimmungen		
	Getreide	Raps	Ackerbohnen/ Futtererbsen		Hang-neigung > 2 % (m)	Gewäs-serab-stand (m)	Abstand zu Saumstrukturen (0, 50, 75, 90 %) (m)
Amega	5,0 l/ha	-	-	14	-	*	20, 0, 0, 0
Durano TF	5,0 l/ha	-	-	14	-	*	20, 0, 0, 0
Glyfos Supreme	4,0 l/ha	-	-	7	-	*	20, 20, 0, 0
Plantaclean Label XL (nicht in Triticale, Roggen)	5,0 l/ha	4,0 l/ha	-	7	-	*	20, 0, 0, 0
Roundup PowerFlex	-	3,0 l/ha	3,0 l/ha	7	-	*	20, 20, 0, 0
	3,75 l/ha	-	-	7	-	*	20, 20, 20, 0
Roundup Rekord	2,5 kg/ha	2,0 kg/ha	2,0 kg/ha	7	-	*	20, 20, 20, 0
Taifun forte	5,0 l/ha	-	-	7	-	*	20, 20, 0 , 0

* länderspez. Gewässeabstand beachten

Copyright © Beiselen GmbH · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte!
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.